

Aliment complet pour la finition des poulets de chair.**PREABATTAGE VOLAILLE MIXTE N****Mode d'emploi :****UTILISATION :**

Distribuer à volonté 5 jours avant l'abattage.

Eau propre et fraîche à discrétion.

Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA-STNO, convient aux filières "Nourri sans OGM < 0.9%".

Composition :

Maïs, Blé, Tourteau Feed d'extraction de tournesol décortiqué, Farine basse de blé, Tourteau feed de pression de colza, Remoulage de blé, Drèches de distillerie de blé, Son de blé, Tourteau Feed d'extraction de soja, Pois, Carbonate de calcium, Prémélanges d'additifs, Sel, Bicarbonate de sodium, Huile de colza

Garanties analytiques :

Protéine Brute	16.0 %
Matières Grasses Brutes	3.0 %
Cendres Brutes(M.Minér)	4.5 %
Cellulose Brute	5.5 %
Phosphore	0.51 %
Calcium	0.65 %
Sodium	0.15 %
Lysine	7.6 g/kg
Méthionine	3.1 g/kg

Additifs :**VITAMINES**

3a672a Vitamine A (Acétate de rétinol)	4 000 UI/kg
3a671 Vitamine D3	1 500 UI/kg
3a700 Vitamine E (acétate de dl-alpha-tocopheryl)	14 UI/kg
3a821 Vitamine B1	1.0 mg/kg

OLIGO-ELEMENTS

3b103 Fer (Sulfate de fer monohydraté)	20 mg/kg
3b405 Cuivre (Sulfate cuivre pentahydraté)	6 mg/kg
3b502 Manganèse (Oxyde de manganèse)	46 mg/kg
3b603 Zinc (Oxyde de zinc)	32 mg/kg
3b201 Iode (Iodure de potassium)	0.8 mg/kg
3b801 Sélénium (Sélénite de sodium)	0.12 mg/kg

ACIDES AMINES, LEURS SELS ET ANALOGUES

soit en acide monomère	0.24 g/kg
3c307 Analogue hydroxylé de la méthionine	0.31 g/kg

AMELIORATEURS DE DIGESTIBILITE

4a18 (FYT/kg)	
6-Phytase EC 3.1.3.26	730 .

Mentions spéciales :

Eviter d'utiliser en même temps que de l'eau d'abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a été ajouté.
Ne pas utiliser cet aliment pour une autre espèce.